

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 16-7-71 192004

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE" Tél. RENNES (99) 36-01-74

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux, Route de Fougères, RENNES

C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 130

12 JUILLET 1971

HARICOT

PUCERONS : Des attaques de pucerons, plus ou moins importantes et parfois graves, sont signalées sur haricots dans les départements du Finistère et du Morbihan, notamment sur les variétés destinées à la conserve. Ces attaques sont la conséquence des températures exceptionnellement élevées de ces derniers jours.

Les traitements peuvent être effectués avec l'une des matières actives indiquées contre les pucerons des cultures légumières, dans le bulletin n° 126 de Mars. Il est impératif de bien respecter les délais d'emploi avant récolte mentionnés dans le bulletin n° 127 d'Avril.

Les stades végétatifs se situant généralement entre la floraison et la présence de jeunes gousses, nous signalons que le Mevinphos nous apparaît particulièrement indiqué en raison de son action de choc et de son effet endotherapique. Possédant par ailleurs une faible rémanence, il présente l'avantage de ne pas laisser de résidus.

TOMATE

PUCERONS : Des attaques ont également été signalées. Il convient donc de bien surveiller les cultures afin d'intervenir avant que des dégâts ne soient commis.

POIREAU

THRIPS : Ce minuscule insecte, de forme allongée, se multiplie activement en cette période de temps chaud. Ses dégâts se traduisent par l'apparition de zones d'aspect gris-plombé, un peu blanchâtre. La végétation est très ralentie et la reprise des jeunes plants parfois difficile.

La lutte contre cet insecte consiste à effectuer une pulvérisation avec l'un des produits suivants :

Diazinon : 25 g/hl, Lindane : 30 g/hl, Malathion : 75 g/hl, Parathion éthyl : 25 g/hl, Parathion méthyl : 40 g/hl

POMME DE TERRE

DORYPHORE : Une recrudescence d'activité ayant été constatée en divers secteurs, il est conseillé de rester vigilant pour détruire à temps les larves de ce ravageur.

POMMIER - POIRIER

CARPOCAPSE : Dans les vergers où le dernier traitement a perdu de son efficacité en raison des pluies récentes, il y a lieu de renouveler la protection des arbres. Ces indications concernent notamment les plantations où les attaques de ce ravageur sont habituellement graves. Bien respecter les délais d'emploi avant récolte.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

G. PAITIER et G. CHARPENTIER.

Le Chef de la Circonscription
Phytoproducteur "BRETAGNE"

J. DELOUSTAL.

Dernière note : Bulletin n° 130 du 1er Juillet